

## Corydoras sterbai, dure jongens

Een iedere aquariaan heeft wel eens een Corydoras soort in zijn aquarium (gehad). En dat is ook niet zo vreemd want het zijn leuke bodembewoners en er bestaan wel 240 soorten Corydoras. Maar er zijn slechts zo'n 10 soorten regelmatig in de aquariumhandel te verkrijgen, van goedkope tot een wat duurder soort. Tot die laatste behoort de Corydoras sterbai maar het is dan ook wel een hele mooie Corydoras.

Zoals gezegd en hier op de afbeeldingen te zien is, is de Corydoras sterbai mooi getekend. De decoratie op zijn kop ziet er uit als een donker grijsbruin kant op een zilveren achtergrond, waar stippen en punten zijn opengelaten. Het lichaam is met golflijntjes bedekt die onderling aan elkaar zitten waardoor het lijkt alsof er een donker streeppatroon wordt gevormd. Heel mooi zijn ook de helder



geel-oranje borst- en buikvinnen en bij sommige vissen is zelfs de eerste straal in de rugvin helder oranje.

Als je bedenkt dat een redelijk schoolje uit zo'n 10-15 stuks bestaat en dat de prijs per stuk bij een redelijk formaat snel tot wel 20€ kan oplopen, is het begrijpelijk dat deze Corydoras soort niet als eerste gekozen wordt.

Maar wanneer men de bedoeling heeft om met dit soort te kweken, dan is deze Corydoras wel een hele mooie keuze.

Het kweken met dit soort is goed te doen. Met een mannetje en twee vrouwtjes kan men in betrekkelijk korte tijd een aardige aantal opbouwen. Zet deze dieren in een van te voren klaargemaakt kweekbakje van tenminste 50cm, waarin wat planten,



kienhout, of kokosnotendoppen zitten waar de dieren zich in kunnen verstoppen. Breng de temperatuur op 25 °C en meestal beginnen ze dan al na een dag of twee spontaan aan het paringsritueel.

Dit resulteert meestal in het afzetten van zo'n 100 eitjes die na ca. 4 dagen uitkomen.

De Corydorass sterbai, net als andere Corydorassen, leven in het wild in grote groepen van soms wel honderden vissen. Vreemd genoeg vermengen de soorten zich als regel nooit. De mannetjes kunnen ongeveer 6cm worden terwijl de vrouwtjes tot wel 7cm groot kunnen worden.

Een Corydorass die er heel veel op lijkt is de Corydorass haraldschultzi, deze kan over het algemeen nog iets groter worden. Zijn tekening is precies tegenovergesteld, namelijk wit op zwart =>.

De Corydorass besteedt een groot deel van zijn tijd aan het doorspitten van de bodem op zoek naar voedselresten. Deze kunnen bestaan uit muggenlarven, artemia en andere kleine diertjes.

Belangrijk is dat de Corydorass niet te veel eenzijdig voedsel krijgt. Hoe meer variatie, hoe beter.

Ze duwen hun kopjes in het substraat en keren de bodem continue om en om. Met hun staarten veroorzaken ze een werveling die het afval doet opwaaien, wat door de stroming naar het filter gaat.

We zouden ze dan ook echte opruimers kunnen noemen. Omdat deze dieren altijd met hun kopjes over de bodem

gaan, is het belangrijk dat het aquarium is ingericht met fijn zand zodat de baardtasters niet worden beschadigd. De baarddraden spelen namelijk een hele belangrijke rol bij het aftasten naar verborgen voedseldiertjes.

Bovendien gebruikt de Corydorass deze baarddraden ook als communicatiemiddel tijdens de paring. Ze worden dus zowel gebruikt voor de reuk als voor de tast.

In tegenstelling tot andere Corydorass soorten, is de Corydorass sterbai niet alleen op de bodem te vinden maar zwemmen ook vaak omhoog naar het middengedeelte van het aquarium, waar ze een wortel, hoge steen of plant uitzoeken om, liefst in het schaduwgedeelte, staande op hun borstvinnen, even uit te rusten.

Men zegt dat Corydorass die in een aquarium opgroeien ietwat kleiner blijven dan hun soortgenoten in het wild. Een belangrijke rol hierbij speelt het voedsel wat ze toegediend krijgen. Bij een goed gevarieerd dieet van goede kwaliteit, waarbij voldoende levend voer zit, zou er geen achterstand in groei mogen optreden.

Ook heel belangrijk is het regelmatig verversen van het water, zodat de door de dieren geproduceerde groei-remstoffen uit het water worden verwijderd.

Het is wel bekend dat deze dieren beter niet met een schepnetje uit het water gehaald moeten worden vanwege hun verdedigingsmechanisme van het uitzetten van de drie vinnen.

Bij iedere Corydorass soort vindt men een eerste vinstraal bij de borstvinnen en rugvin die vergrendeld kan worden wanneer ze uitstaan bij gevaar. Beter is ze met een bakje uit het water te halen of wanneer er toch een netje wordt gebruik, het netje rustig in het volgende water te laten hangen zodat ze er zelf uit kunnen zwemmen.

Een Corydorass sterbai, wanneer deze goed wordt verzorgd, kan wel een jaar of 7 oud worden.

