


Trigonostigma dilemma's



Vroeger werden deze vissen ingedeeld bij het genus Rasbora.

De kegelvlekbarbeel (*Trigonostigma heteromorpha*), hockeystickbarbeel (*Trigonostigma hengeli*) en de *Trigonostigma espei* worden vaak met elkaar verward. De foto's van deze vissen die op het internet circuleren bewijzen dit.

Hoewel ze bij een nauwkeurige inspectie eigenlijk redelijk gemakkelijk uit elkaar te onderscheiden zijn. Het verschil tussen deze vissen is aan een aantal dingen te zien. Indien ze volwassen zijn is *Trigonostigma hengeli* de kleinste van de drie, de *Trigonostigma heteromorpha* de grootste. Logischerwijs zit de *Trigonostigma espei* er dus tussenin.

Wat kleur betreft heeft de *Trigonostigma heteromorpha* een rozige kleur met een grote driehoekige donderen vlek. Bij de *Trigonostigma espei* en de *Trigonostigma hengeli* heeft de vlek echt een hockeystickvorm. De *Trigonostigma hengeli* heeft hier een fel oranje streep boven, de *Trigonostigma espei* is helemaal oranje. Binnen elke soort zijn er ook min of meer kleur- en patroon verschillen.

T. somphongsi is nog een vierde, maar uitzonderlijk zeldzame, lid van het genus met gelijkenis, maar deze is heel gemakkelijk te onderscheiden van de anderen, aangezien de donkere lichaamsvlek verminderd is tot een dikke streep.